

RYDER HEALTH PLAN, INC.

Cubierta de Servicios Preventivos Niños, Mujeres y Adultos 2021

Estos servicios están cubiertos sin costo compartido, de acuerdo a la edad y género del suscriptor, bajo las Cubiertas Ryder Directo Oro y Ryder Directo Platino.

Servicios Preventivos para Niños

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---|---------------------------|
| Uso de drogas y alcohol – evaluación y consejería para los adolescentes. | 99408, 99409, G0396, G0397, G2011 | Z13.89, F10.10, F10.120 |
| Autismo – cernimiento en niños de 12 a 36 meses. | 96110 | Z00.13.41 |
| Comportamiento – evaluación para los niños de todas las edades. | 99402-99404 S9452, S9470 S9455, S9460 | Z71.3 |
| Presión sanguínea – cernimiento para los niños de todas las edades. | 99401-99404 99381-99384 99391-99394 | Z13.6 |
| Displasia cervical – cernimiento en féminas sexualmente activas. | 99401-99404 99381-99384 99391-99394 | Z72.51, Z72.52, Z72.53 |
| Hipotiroidismo congénito – cernimiento en todos los recién nacidos. | 99381, 99391 | Z13.29 |
| Prevención de caries dental: infantes y niños hasta 16 años – El USPSTF recomienda la aplicación de varnish de fluoruro a dientes primarios de todos infantes y niños comenzando en la edad primaria de erupción de dientes. El USPSTF recomienda a los médicos de atención primaria recetar suplementos de fluoruro oral a partir de los 6 meses de edad para los niños cuyo suministro de agua es deficiencia de fluoruro. | 99188, 99401, 99402 99381, 99382, 99391, 99392 | Z41.8, Z29.3 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---|---|
| Depresión – cernimiento en niños de 12-18 años. | 99383-99385 99394, G0444 | Z00.121, Z00.110, Z13.31 |
| Desarrollo – cernimiento en niños menores de 3 años. | 96110 | Z00.121, Z00.129 |
| Dyslipedemia – cernimiento en niños con alto riesgo. | 80061, 82465, 83718 | Z13.220 |
| Quimioprevención de Fluoruro – suplementos para niños que no tienen fluoruro en sus fuentes de agua. | D1208 | |
| Gonorrea – medicación preventiva en los ojos de todos los recién nacidos. | | |
| Audición – cernimiento en los recién nacidos. | 92558, 92586 99381, 99391 | Z00.110, Z00.111, Z01.10, Z01.118 |
| Altura, peso y masa corporal – medidas para niños hasta los 17 años. | 99401-99404 99381-99384 99391-99394 | Z00.121, Z00.129 |
| “Hemotocrit or Hemoglobin” – cernimiento. | 85014, 85018 | Z00.121, Z00.129 |
| “Hemoglobinopathies”- cernimiento recién nacidos. | | |
| Enfermedades de Células Falciforme | 99381, 99391 81200-81355, 81400-81479 | Z13.0 |
| HIV – cernimiento en adolescentes y adultos entre las edades de 15 a 65 años. | G0432, G0433, G0435 G0475 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.521-O09.529 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0-O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---|---------------------------|
| Inmunización – Hepatitis B | 90740, 90743, 90744, 90747 90748, S3645 | Z22.51 |
| Inmunización - Rotavirus | 90680, 90681 | Z23 |
| Inmunización – Diphtheria, Tetanus & Acellular Pertussis (DTaP) | 90700, 90698, 90723 | Z23 |
| Inmunización – Diphtheria, Tetanus & acellular pertussis (Tdap) | 90715 | Z23 |
| Inmunización – Inactivated Poliovirus (IPV) | 90713, 90696, 90698 | Z23 |
| Inmunización – Haemophilus Influenzae, Type B (Hib) | 9046-90648, 90698, 90721 90644 | Z23 |
| Inmunización– Pneumococcal Conjugate (PCV13/PPSV23) | 90732, 90670, 90732 | Z23 |
| Inmunización – Measles, Mumps, and Rubella | 90707, 90710 | Z23 |
| Inmunización - Varicella | 90716 90710 | Z23 |
| Inmunización - Hepatitis A | 90633, 90634, 90636, | Z22.59 |
| Inmunización- Meningococcal | 90733, 90734, 90644 | Z20.811 |
| Inmunización - Influenza | 90654-90658, 90660-90662 90672, 90673, 90685-90688 | Z23 |
| Inmunización – Human Papillomavirus | 90649, 90650 | Z11.51 |
| Hierro – suplementos para niños de 6 – 12 meses en riesgo de anemia por deficiencia de hierro. | | |
| Plomo – cernimiento para niños entre las edades de 1 a 5 años con riesgo de exposición. | 83655 | Z13.88 |
| Historial médico – durante el desarrollo hasta los 10 años. | 99401-99404, 99381-99384 99391-99394 | Z00.121, Z00.129 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|--|---|
| Obesidad – cernimiento en niños mayores de 6 años. | 99401-99404, 99383-99384 99393-99394 | Z00.110, Z13.89, Z13.228 |
| Salud oral – evaluación de riesgo para niños hasta los 10 años. Aplicaciones de fluoruro a infantes y niños hasta los diez (10) años. | D0120, D0140, D0150, D0160 D0180 | |
| Historial Médico para todo niño a través de su desarrollo en las edades de 6 a 11 meses, 1 a 4 años y 5 a 10 años. | | |
| Phenylketonuria (PKU) – cernimiento para este desorden genético en recién nacidos. | 84030 | Z13.228 |
| Infecciones de Transmisión Sexual – consejería y prevención para todos los adolescentes sexualmente activos. | 99401-99404, 99381-99384 99391-99394 | Z11.3 |
| Intervenciones de uso de tabaco: niños y adolescentes – El USPSTF recomienda que los médicos clínicos de muestren intervenciones, incluyendo la educación para un breve consejo para prevenir el inicio del uso del tabaco en niños y adolescentes en edad escolar. | 99383-99385, 99393-99395, 99404 | Z00.121, Z00.129, Z000.110, Z00.111, Z00.00, Z00.01 |
| Consumo de tabaco, alcohol o drogas: detección de niños (11) a (21) años de edad. | | |
| Tuberculina – pruebas para niños en alto riesgo hasta los 17 años. | 99401-99404, 99381-99384 99391-99394, 86580 | Z11.3 |
| Visión – cernimiento para todos los niños de 3 a 5 años para detectar la presencia de “amblyopia”. | 99382, 99392, 99173, 99174 | Z01.00, Z01.01, Z13.5 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|---|---------------------------|
| Cáncer en la Piel (Apoyo de conducta) – El USPSTF recomienda apoyo a niños, adolescentes y adultos jóvenes entre las edades de 10 a 24 años. | 99401-99404 99381-99382 99391-99392 | Z11.3 |
| Infección por sífilis en adultos y adolescentes no embarazadas: El USPSTF recomienda la detección de la infección por sífilis en personas que tienen un mayor riesgo de infección. | | |
| Hepatitis B – Cernimiento en adolescentes con alto riesgo de infección. | | |
| Evaluación médica anual en el inicio del curso escolar – Evaluación física, mental, salud oral, cernimiento de visión, y audición, además de todos los cernimientos periódicos recomendados por la Academia Americana de Pediatría. La misma incluye los servicios preventivos por la ley sin costo alguno más allá de la prima que se estableció originalmente para dichos planes. | | |
| Salud oral – aplicación (tópica) de barniz de fluoruro a niños menores de 5 años de edad. | | |

Servicios Preventivos para la Mujer (incluyendo embarazadas)

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|------------------------------------|---|
| Anemia – cernimiento rutinario en embarazadas. | 85013, 85014, 85018 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |
| Bacteriuria - cernimiento y pruebas a embarazadas de 12 a 16 semanas. Incluye prueba de orina. | 87081, 87084, 87086 87088 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|--|--|
| Enfermedades de Transmisión Sexual | 99401-99404 99385-99387 99395-99397 | Z11.3 |
| Uso de Tabaco | 99406-99407 99385-99387 99395-99397 | Z87.891 |
| Sífilis | 86592, 86593, 87166, 87164, 87285 | Z00.00, Z00.01 |
| BRCA – cernimiento y pruebas, acerca de pruebas genéticas para mujeres de alto riesgo. | 99401-99404 S0265 81215, 81216, 81217 81163-81167 | Z80.3, Z80.41, Z85.3, Z85.44, Z71.83 |
| Medicación para Cáncer del Seno – el USPSTF recomienda la asesoría médica sobre esta medicación para reducir sus riesgos. | | |
| Mamografía Cáncer del Seno – cernimiento cada 1-2 años en mujeres mayores de 40 años. Para mujeres de 50 a 74 años “biennial screening mamography”. | 77063, 77067 | Z12.39, Z12.31 |
| Quimioprevención de Cáncer de Seno – consultoría para mujeres de alto riesgo. | 99401,99402 99385-99387 99395-99397 | Z80.3, D24.1, D24.9, N60.82 |
| Lactancia – evaluación comprensivo y equipo de lactancia para cada nacimiento. | 99401-99403, S9443, E0603, A4282, A4284 | Z34.03,Z34.83 Z39.1 |
| Examen de detección del cáncer de cuello uterino: El USPSTF recomienda la detección de cáncer cervical cada 3 años con citología cervical sola en mujeres de 21 a 29 años. Para las mujeres de 30 a 65 años, la USPSTF recomienda la detección cada 3 años con citología cervical sola, cada 5 años con alto riesgo pruebas del virus del papiloma humano (hrHPV) solo, o cada 5 años con pruebas de hrHPV en combinación con citología (análisis). | 88141-88143 88147-88148, 88150 88152, 88155, 88164-88167 88174-88175 88153, 88154 | Z00.00, Z01.411, Z12.4, Z11.51 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|--|--|
| Cernimiento de Infección de Clamidia | 87270, 87320, 87491, 87810 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 Z11.8 |
| Anticonceptivos – todos los métodos aprobados por la FDA, procedimientos de esterilización y educación y consejería. | 99401-99404, 99384-99386, 99394-99396 | Z30.09 |
| Anticonceptivos - Injection | J2675, 96372 | Z30.013, Z30.014 Z30.018, Z30.019 |
| Anticonceptivos – Copper IUD | J7300 IUD Insertion – 58300 IUD Removal – 58301 Emergency Contraception - >S4993 | Z30.430, Z30.432 Z30.433 |
| Anticonceptivos – Hormonal IUD with Progestin | J7298 IUD Removal – 58300 IUD Insertion - 58301 | Z30.430, Z30.432 Z30.433 |
| Anticonceptivos – Implantable Rod | J7307 Implantable ROD Insertion - 11981 | Z30.49 |
| Anticonceptivos – Sterilization Surgery | 58565, 58605, 58611, 58615, 58670, 58671 | Z30.2 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|---|----------------------------------|
| Anticonceptivos - Sterilization Implant | 58565, A4264 | Z30.2 |
| Anticonceptivos – Diaphragm with Spermicide | A4266, A4269 | Z30.018 |
| Anticonceptivos - Sponge with Spermicide | A4269 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Cervical Cap with Spermicide | A4261, A4269 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Female Condom | A4268 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Spermicide | A4269 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Combined Pill “The Pill” (estrogen and progestin) | S4993 (Pill for birth control) | Z30.011, Z30.41 |
| Anticonceptivos – Oral Contraceptives (Progestin-only) “The Mini Pill” | S4993 (Pill for birth control) | Z30.011, Z30.41 |
| Anticonceptivos – Oral Contraceptives (Extended/Continuous use) “The Pill” (estrogen and progestin) | S4993 (Pill for birth control) | Z30.011, Z30.41 |
| Anticonceptivos – Patch | J7304 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Vaginal Contraceptive Ring | J7303 | Z30.018 |
| Anticonceptivos – Plan B/ Plan B One Step / Next Choice | S4993 | Z30.011, Z30.41 |
| Violencia doméstica – cernimiento y consultoría. | 99401-99404 | Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419 |
| Ácido Fólico – El USPSTF recomienda que toda mujer en planificación o capaz de embarazo tome un suplemento diario conteniendo 0.4 a 0.8 mg (400 a 800mg) de ácido fólico. | 99401-99404 99384-99386 99394-99396 | Z41.8 |
| Diabetes Gestacional – cernimiento para mujeres embarazadas de 24 ó más semanas de gestación, y para mujeres de alto riesgo en su primera visita prenatal. | 82947, 83036, 82950 | Z86.32 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|------------------------------------|--|
| Gonorrea – cernimiento para toda mujer sexualmente activa incluyendo mujeres embarazadas. | 87590, 87591, 87850 | Z11.59, Z34.00 Z34.80-Z34.83 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |
| Hepatitis B – cernimiento en mujeres embarazadas, en su primera visita prenatal. | 80055, 87340, 80081 | Z34.00-Z34.03 Z34.80-Z34.83 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 Z11.59 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|--|--|
| <p>Human Immunodeficiency Virus (HIV) – cernimiento en todas las mujeres embarazadas. Por el Departamento de Salud es mandatorio ofrecer a toda mujer embarazada las siguientes pruebas:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Una primera prueba del HIV durante el primer trimestre de gestación o en la primera visita prenatal, y</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Una segunda prueba durante el tercer trimestre de gestación (entre las 28 y las 34 semanas de embarazo).</p> | <p>99401, 99402, 99403, 99404 G0432, G0433, G0435, G0475</p> | <p>Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291,V23.3 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93</p> |
| <p>Human Papillomavirus (HPV) DNA test – cernimiento en mujeres de 30 años o más con una frecuencia no menor a 3 años.</p> | <p>87623, 87624</p> | <p>Z11.51</p> |
| <p>Osteoporosis – cernimiento en mujeres de 65 años o más, en menores de alto riesgo.</p> | <p>77080, 77081</p> | <p>Z13.820</p> |
| <p>Prueba de osteoporosis: mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con mayor riesgo de osteoporosis: El USPSTF recomienda la prueba de osteoporosis con pruebas de medición ósea para prevenir fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen un mayor riesgo de osteoporosis, según lo determine una herramienta de evaluación de riesgos clínicos.</p> | | |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---------------------------------------|--|
| Incompatibilidad RH (D) – pruebas a todas la mujeres embarazadas en la primera visita relacionada a su embarazo, y luego entre las 24 y 28 semanas de gestación. | 86850, 80055, 80081 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |
| Uso de tabaco – El USPSTF recomienda cernimiento e intervención en todas las mujeres y ofrecer consejería a las embarazadas usuarias. | 99406-99407, 99384-99386, 99394-99396 | Z87.891 |
| Infecciones de Transmisión Sexual – consejería a todas las mujeres sexualmente activas. | G0445, 99401-99404 | Z71.89, Z72.52, Z72.53 |
| Sífilis – cernimiento a todas las mujeres de alto riesgo y a todas las embarazadas. | 86593, 87166, 87164, 87285 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|------------------------------------|---|
| <p>Detección de la incontinencia urinaria en las mujeres: la Iniciativa de Servicios Preventivos de la Mujer recomienda evitar a las mujeres la incontinencia urinaria como un servicio preventivo. Los factores asociados con un mayor riesgo de incontinencia urinaria incluyen aumento de la paridad, edad avanzada y obesidad; sin embargo, estos factores no deben usarse para limitar la detección.</p> | <p>99401-99404</p> | <p>Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419</p> |
| <p>“Well-woman Visits”- visitas para obtener las recomendaciones de los servicios preventivos aplicables de acuerdo a la edad de la mujer.</p> | <p>99384-99387 99394-99397</p> | <p>Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419</p> |
| <p>Prevención Preclamsia – aspirina en dosis bajas (81mg/d) como medicación preventiva después de 12 semanas de gestación en mujeres que están en alto riesgo de preclamsia.</p> | | <p>Z11.59, Z34.00 Z34.80-Z34.83 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0- O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93</p> |
| <p>Depresión perinatal: asesoramiento e intervención – El USPSTF recomienda que los médicos brinden o remitan a las personas embarazadas y posparto que tienen un mayor riesgo de depresión perinatal a las intervenciones de counseling.</p> | <p>96161</p> | <p>Z00.110, Z00.111, Z00.121, Z00.129</p> |

| Servicios Preventivos para Adultos | | |
|--|---|---|
| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
| Aneurisma abdominal aórtico – 1 revisión por ultrasonografía para hombres de 65 a 75 años. | 76706 | Z13.6 |
| Glucosa anormal en sangre y Diabetes Mellitis Tipo 2 – cernimiento por riesgo cardiovascular en adultos entre 40 a 70 años, que estén sobrepeso u obesidad. | | |
| Abuso de alcohol – cernimiento y apoyo para adultos de 18 años o más. | 99408, 99409, G0442, G0443 G0396, G0397, G2011 | Z13.89, F10.10, F10.120 |
| Medicación Preventiva de Aspirina – adultos de 50 a 59 años con 10% \geq riesgo cardiovascular y cáncer colorrectal. | 99401-99404, 99385-99387 99395-99397 | Z41.8 |
| Presión Sanguínea – cernimiento en niveles de presión sanguínea en adultos mayores de 18 años. | 99385-99387 99395-99397 93784, 93786, 93790 | Z13.6 |
| Colesterol – cernimiento en hombres de 20 a 35 años y mujeres de 20 a 45 años con riesgo de enfermedades coronarias y cernimiento para hombres mayores de 35 años y mujeres de 45 años. | 80061 | Z13.220 Z00.00 Z00.01 |
| Cernimiento de cáncer colorrectal en adultos de 50 a 75 años. | | Z12.11, Z12.12 K62.1, D12.2-D12.9 |
| Cernimiento de depresión en adultos | G0444 | Z13.31 |
| Cernimiento de diabetes tipo 2 para adultos con alta presión mayor a 135/80 mm HG. | 82947, 83036 | Z13.1 |
| Prevención de caídas en adultos mayores: ejercicio y terapia física - El USPSTF recomienda ejercicio y terapia física para prevenir caídas en adultos de 65 años o más con mayor riesgo de caídas. | 97001, 97002, 97116, 97530 G0151, G0159, S9131 | Z91.81 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---|---|
| Prevención de caídas en adultos mayores: vitamina D – El USPSTF recomienda suplementos de vitamina D para prevenir caídas en adultos de 65 años o más con mayor riesgo de caídas. | | |
| Consejería de dieta saludable y actividad física para prevenir enfermedades cardiovasculares. | 99401-99404, 99385-99387 99395-99397 | Z13.1 Z13.220 Z13.6 |
| Cernimiento de Hepatitis B adolescentes no embarazadas y adultos – El USPSTF recomienda cernimiento para el virus de hepatitis B (HBV) en personas de alto riesgo de infección. | | |
| Cernimiento de Infección de Hepatitis C en adultos – El USPSTF recomienda cernimientos para el virus de hepatitis C (HCV) en personas de alto riesgo de infección. | G0472 | Z72.51,Z72.52, Z72.53, F11.10, F12.20, F15.129,F19.20 |
| HIV – cernimiento médico para infección de HIV en adolescentes y adultos entre las edades de 15 a 65 años. Adolescentes menores y adultos mayores que sean de alto riesgo también serán cubiertos. | G0432,G0433, G0435, G0475 | Z34.00-Z34.93 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0-O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93 |
| Vacunas -Inmunización Human Papillomavirus | 90649, 90650 | Z23, Z20.2 |
| Vacunas -Inmunización Hepatitis A, | 90632, 90633, 90634 | Z22.59 |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|---|-----------------------------------|
| Vacunas -Inmunización Hepatitis B | 90746, 90747, 90748 | Z22.51 |
| Vacunas -Inmunización Herpes Zoster | 90736 | Z20.5, Z20.6, Z20.828 |
| Vacunas -Inmunización Influenza (Flu Shot) | 90655, 90657, 90656, 90658, 90660 | Z23, Z20.82 |
| Vacunas –Inmunización Measles, Mumps, Rubella (MMR) | 90707, 90710 | Z23 |
| Vacunas –Inmunización Meningococcal | 90733, 90734 | Z20.811 |
| Vacunas –Inmunización Pneumococcal | 90670, 90732 | Z23 |
| Vacunas –Inmunización Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Td/Tdap) | 90700, 90714, 90698, 90714, 90721, 90723 | Z23 |
| Vacunas –Inmunización Varicella | 90716 | Z23 |
| Obesidad – cernimiento para adultos con un índice de masa corporal de 30 kg/m ² o más. | 99401-99409, 99385-99387 99395-99397 | Z13.89 Z68.39, Z68.45 E66.1 |
| Infecciones de Transmisión Sexual – El USPSTF recomienda apoyo de alta intensidad de conducta para prevenir infecciones de transmisión sexual (STIs) para todo adolescente activo sexualmente y para adultos en alto riesgo de STIs. | G0445, 99383-99387 99397, 99401, 99404 | Z71.7, Z71.89, Z72.51-Z72.53 |
| Estatinas para prevenir accidentes cardiovasculares: adultos edades de 40 – 75 años sin historial de CVD, 1 o mas factores de riesgo de CVD | | |
| Medicación de Tabaco- Para aquellos que usan productos de cesación de tabaco. | | |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|--|--|
| <p>Uso de tabaco – El USPSTF recomienda que médicos pregunten a todo adulto, sobre el uso de tabaco y provea intervenciones de detención, para aquellos que usan productos de tabaco. Este plan cubre el despacho de medicamentos para cesar de fumar aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, por noventa (90) días consecutivos en un intento, y hasta dos intentos por año.</p> | <p>99385-99387 99395-99397</p> | <p>Z87.891 Z11.59, Z34.00 Z34.80-Z34.83 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.621-O09.629 O09.811-O09.819 O09.821-O09.829 O36.80X0-O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93</p> |
| <p>Cernimiento de tuberculosis: adultos – El USPSTF recomienda cernimiento de tuberculosis latente en población con mayor riesgo.</p> | | |
| <p>Sífilis – cernimiento en todos los adultos de alto riesgo.</p> | <p>80055, 86592, 86780, 80081</p> | <p>Z11.59, Z34.00 Z34.80-Z34.83 O09.00-O09.03 O09.10-O09.13 O09.291 O09.40-O09.43 O09.211-O09.219 O09.10-O09.13 O09.291-O09.299 O09.30-O09.33 O09.511-O09.519 O09.521-O09.529 O09.611-O09.619 O09.821-O09.829 O36.80X0-O36.80X9 O09.70-O09.899 O09.90-O09.93</p> |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|--|--|-------------------------------------|
| Terapia física, ejercicio y vitamina D – para adultos de 65 años o más con alto riesgo de sufrir caídas. | | |
| Cernimiento de cáncer de pulmón – prueba anual de cáncer en el pulmón con una tomografía computarizada de baja dosis para los adultos entre las edades de 55 y 80 años que han fumado durante 30 años y fuman en la actualidad o hayan dejado de fumar durante los últimos 15 años. Las pruebas deben discontinuarse una vez que la persona no haya fumado durante 15 años o desarrolle un problema médico que limite sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una operación curativa del pulmón. | G0297 | F17.210-F17.213 Z72.0 Z87.891 |
| Phnylketonuria (PKU) – cernimiento para ese desorden genético en adultos. | | |
| Consejería conductual para el cáncer de piel: El USPSTF recomienda asesorar a adultos jóvenes, adolescentes, niños y padres de niños pequeños sobre cómo minimizar la exposición a la radiación ultravioleta (UV) para personas de 6 meses a 24 años con tipos de piel normales para reducir el riesgo de cáncer de piel. | 99383-99385 99393-99395 | Z00.121, Z00.129 Z00.111 |
| Consumo no saludable de alcohol: adultos – El USPSTF recomienda la detección del consumo no saludable de alcohol en entornos de atención primaria en adultos mayores de 18 años, incluidas las mujeres embarazadas, y proporcionar a las personas involucradas en el consumo de riesgo o riesgo con breves intervenciones de asesoramiento conductual para reducir el consumo no saludable de alcohol. | | |

| Procedimiento | Código de Procedimiento CPT | ICD-10 Relacionado |
|---|---|---------------------------|
| Dieta – asesoría intensiva de conducta para adultos con sobrepeso u obesidad, con al menos un factor de riesgo adicional para enfermedades cardiovasculares, para promover una dieta saludable, y actividad física para la prevención de enfermedades cardiovasculares. | 99401-99409, 99385-99387 99395-99397 | Z13.1 Z13.220 |